

التحكم في الأعشاب الضارة بمزارع السلجم الزيتني

الأصناف المتعدلة للمبيدات العشبية PR 45H72, PR 45H73	الأصناف العادمة JURA, TRAPPER	فتررة التدخل
إستعمال مبيد يحتوي على مادة التريفليرلين بكمية 2 ل/hec	المداواة قبل البذر	إستعمال مبيد يحتوي على مادة التريفليرلين بكمية 2 ل/hec
إستعمال مبيد يحتوي على مادة الفعالة "فينازاكور" توبيكا بكمية 2 ل/hec	المداواة بعد البذر وقبل البروزغ	إستعمال المبيد لونتراج 100 بكمية 1 ل/hec مع ضرورة إضافة زيت مثبت
المبيد نوباسرون مع زيت مثبت داش بكمية (1.5 + 1) ل في المكتار	ضد الأعشاب ذات الفاقعتين مرحلة ورقتين إلى ثمانية أوراق	المداواة خلال مرادل النمو
إستعمال المبيد لونتراج 100 بكمية 1 ل/hec مع ضرورة إضافة زيت مثبت سيلاكت سور بكمية 1 ل/hec فوكيس إنتراب بكمية 2 ل/hec سور غالون أو فارديكت بكمية 1 ل/hec	ضد النجليات في مرحلة ثلاثة إلى أربع أوراق حقيقة	

ملاحظات هامة

نجاح عملية المداواة قبل البذر وبعد البذر - قبل البروزغ جد مرتبط بتوفير الرطوبة في التربة.

عند إعتماد تقنية البذر المباشر يتم الإستغناء عن المداواة قبل البذر وبعد البذر - قبل البروزغ و تمويضاً لها بإستعمال مبيد كافي قبل البذر يحتوي مادة القليفورزات بكمية 2 ل.

المبيدات المحتوية على المادة الفعالة سيمازين غير مرخص لها على زراعة السلجم ولا يمكن إستعمالها.

