

الفطر المسبب: (*Puccinia striiformis*)

✿ الزراعات المعنية: القمح الصلب والقمح اللين والتriticum

✿ الأعراض:

- يتسبب المرض في ظهور عدد كبير من البشرات صفراء إلى أرجوانية فاتحة اللون على الأوراق، تنتشر بطريقة منتظمة مع أوردة الورقة في شكل خطوط وكذلك على السنابل عند تطور الإصابات. يتحوّل لون البشرات إلى الأسود في نهاية الموسم وعند اقتراب نضج الحبوب.
- يظهر المرض عند بدايته في بؤر صغيرة ثم سريعاً ما ينتشر في الحقل بواسطة الرياح.



✿ أعراض مشابهة:

لا توجد أعراض شبيهة لأعراض مرض الصدا الأصفر.

✿ الدورة الحياتية:

تستمر حياة الفطر على بقايا الزراعة وعلى نبات الحبوب المطروعة إلى حين توفر ظروف مناخية ملائمة من رطوبة عالية وحرارة معتدلة ما بين (C5°C و C15°C) وأشعة الشمس ضعيفة حيث ينتقل الفطر إلى الزراعة بواسطة الرياح ويكون انتشاره سريعاً.

✿ مرحلة المراقبة: مرحلة التجدير

✿ تردد المرض: مرتفع

✿ الأضرار: عالية جداً على الأصناف الحساسة (خسائر في المردود الحي قد تصل إلى حدود 70%).

✿ طرق المكافحة:

■ المكافحة الكيميائية

- التدخل حال ملاحظة الإصابات الأولى للمرض بالمبادرات المناسبة والمحتوية على عائلات المواد الفعالة التالية: Strobilurines (ستروبيلوريينز) في التدخل الوقائي وTriazoles (триازوليز) في التدخل العلاجي.

■ المكافحة الزراعية

- ردم بقايا الزراعة والنجليات المطروعة بالحراثة،
- التأخير في موعد البذر،
- عدم الإفراط في كثافة البذر،
- عدم الإفراط في التسميد الأزوتني.

■ المكافحة الوراثية

- زراعة الأصناف المتحملة للمرض.

المبيدات المصادق عليها من وزارة الفلاحة ضد مرض الصدأ الأصفر

الجرعة	المادة الفعالة	الاسم التجاري
0,8 ل/hec	Azoxystrobin	Amistar SC, Ortiva SC Tazer 250 SC Affix 250SC Azox SC
2 ل/hec	Azoxystrobin + Chlorothalonil	Priori Opti SC
1,25 ل/hec	Azoxystrobin + Epoxiconazole	Serial 150 EC
0,8 ل/hec	Azoxystrobin + Propiconazole	Quilt Xcel SE
1 ل/hec	Azoxystrobin + Tebuconazole	Altitud Gold 240SC
1,5 ل/hec	Boscalid + Epoxiconazole	Bell Extra SC
1,5 ل/hec	Chlorothalonil + Propiconazole + Cyproconazole	Cherokee 487,5 SE
0,5 ل/hec	Cyproconazole + Azoxystrobin	Amistar Xtra SC
0,5 ل/hec	Cyproconazole + Azoxystrobin	Priori Xtra SC
2 ل/hec	Cyproconazole + Chlorothalonil	Champion SC
2 ل/hec	Cyproconazole + Chlorothalonil	Cyclone SC
1,5 ل/hec	Fenpropimorphe + Epoxiconazole + Metrafenone	Capalo SC
1 ل/hec	Fenpropidine + Propiconazole	Zenith 575 EC
0,5 ل/hec	Fluoxastrobine + Tebuconazole	Evito T SC
1 ل/hec	Flutriafol	Impact S SC
0,75 ل/hec	Flutriafol + Tebuconazole	Pointer Duo SC
0,8 ل/hec	Fluxapyroxad + Pyraclostrobine	Priaxor SE
0,5 ل/hec	Propiconazole + Cyproconazole	Alto super EC
0,8 ل/hec	Prothioconazole + Tebuconazole	Prosaro 250 EC
1 ل/hec	Prothioconazole + Tebuconazole + Bixafen	Skyway Xpro EC
1 ل/hec	Prothioconazole + Trifloxystrobine	Madison 263 SC
1 ل/hec	Pyraclostrobine + Epoxiconazole + Fluxapyroxad	Ceriax EC
0,75 ل/hec	Pyraclostrobine + Metconazole	Optimo Duo EC
0,5 ل/hec	Tebuconazole	Metrostar SC
1 ل/hec	Tebuconazole + Trifloxystrobine	Nativo 300 SC
0,8 ل/hec	Triadimenol + Spiroxamine + Tebuconazole	Falcon 460 SC